

GOTAS PARA CIRUGÍA DE CATARATAS



1 – Broncear

BESIVANCE (or Moxifloxacin / Ciprofloxacin)

Empiese 3 días antes de la cirugía. 4 veces al día.

Suspenda 1 semana después de la cirugía

2 – Gris

BROMSITE (or Ketorolac)

Empiese 3 días antes de la cirugía. 2 veces al día.

Suspenda 4 semanas después de la cirugía

3 – Rosa or Blanca

DUREZOL (or Prednisolone)

Empiese después de la cirugía. 4 veces al día durante 1 semana, entonces
3 veces al día durante 1 semana, entonces
2 veces al día durante 1 semana, entonces
1 vez al día durante 1 semana.

ESPERE 5 MINUTOS ENTRE CADA GOTA

NO SE TOQUE EL OJO DURANTE 1 SEMANA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

*** POR FAVOR TRAIGA SUS GOTAS A TODAS LAS CITAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA***

3 días antes	2 días antes	1 día antes
Besivance	Besivance	Besivance
Bromsite	Bromsite	Bromsite

SEMANA 1	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
	Besivance 	Besivance 	Besivance 	Besivance 	Besivance 	Besivance 	Besivance
	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite
	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol

SEMANA 2	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14
	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite
	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol

SEMANA 3	Día 15	Día 16	Día 17	Día 18	Día 19	Día 20	Día 21
	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 
	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 

SEMANA 4	Día 22	Día 23	Día 24	Día 25	Día 26	Día 27	Día 28
	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 	Bromsite 
	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 	Durezol 