

APALİQUA NP 11-37

ÜMUMİ TƏSVİRİ

APALİQUA NP 11-37 gübrəsi, fosfor və azot tərkibli olub, bitkilərin inkişafını təmin edən və məhsuldarlığı artıran yüksək səmərəli bir maye gübrədir.

Bu gübrə, xüsusilə ammonium polifosfat (APP) tərkibli olması sayəsində torpağın və bitkilərin fosfora olan tələbatını qarşılayır və səmərəli şəkildə tətbiq edilir.

Gübrə haqqında:

- Gübrənin tərkibindəki Ammoniumpolifosfat torpaqda hissə-hissə sərbəst buraxılır;
- Yüksək Ph-lı torpaqlarda digər fosfor tərkibli dənəvər gübrələrdən fərqli olaraq bloklanmır;
- Kirəcli gilli torpaqlarda daha səmərəlidir;
- Kökdənkənar, yarpaqdan tətbiq edilməsi quraqlıq ərazilərdə bitkilərin məhsuldarlığına müsbət təsir göstərir
- Gübrənin maye formalı olması dənəvər gübrələrlə müqayisədə onun torpaqda həll olunması üçün maye tələb etməməsidir;
- APP ən müasir fosfor tərkibli gübrə olmaqla həm torpaqdan, həm də yarpaqdan tətbiq olunaraq yüksək səmərəlilik göstərir.
- APP digər bitki mühafizə vasitələri və gübrələrlə qarışdırıla bilər. Kalsium tərkibli gübrələri çıxmaq şərti ilə.

Tərkibi:

- Azot (N): 11%
- Fosfor (P₂O₅): 37%
- Ammonium Polifosfat (APP): Yüksək səmərəli tətbiq təmin edən komponent

Üstünlükləri:

- Torpağa və bitkilərə sürətli təsir
- Aşağı dozada yüksək səmərəlilik
- Yüksək fosfor təminatı, kök inkişafını dəstəkləyir və çiçəklənməni gücləndirir
- Torpaq və bitkilər üçün uzun müddətli təsir göstərir

ƏKİN QABAĞI TƏTBİQİ

Doza: APALQUA NP 11-37 -100-150 kq /ha

Tətbiq Zamanı:

- Əkin qabağı (torpağa çiləmə üsulu ilə)

Tətbiq Üsulu:

- Gübrə torpağa çilənərək əkin qabağı tətbiq olunmalıdır
- Torpağa bərabər şəkildə yayılmasına diqqət yetirilməlidir

Qeyd:

- Tətbiqdən sonra torpağın 5-10 sm dərinliyinə diskli mala ilə qarışdırılması məsləhətdir.

VEGETASIYA BAŞLADIQDA- YAZDA TƏTBİQİ

Doza: APALQUA NP 11-37 20-30 kq/ha

Həll Edilməsi: 300 litr suda

Tətbiq Zamanı:

- Yazın əvvəli vegeqasiya mövsümünün başlanğıcından etibarən

Tətbiq Üsulu:

- Maye gübrənin yarpaqdan 2 dəfə tətbiq edilməsi daha məqsədə uyğundur (yazda, bitkinin böyümə dövrünün başlanğıcında kollanmanın əvvəlində və boruya çıxma mərhələsində).
- Çiləmə axşam saatlarında iri dənəvari damcılar şəklində tətbiq olunmalıdır. Məqsəd damcıların müəyyən hissəsinin torpağa düşməsi və köklər vasitəsi ilə mənimsənilməsidir.

ƏKİN QABAĞI TƏTBİQİ

Doza: APALQUA NP 11-37 -100 kq/ha

Tətbiq Zamanı: Əkindən öncə

Tətbiq Üsulu:

- Gübrəni torpağa çilənərək tətbiqi.
- Torpağın üst qatını 5-10 sm dərinlikdə qarışdırın.

BİÇİNDƏN SONRA TƏTBİQ

Doza: APALQUA NP 11-37 - 15 kq/ha

Tətbiq Zamanı: Biçindən 7-10 gün sonra

Tətbiq Üsulu:

- Çiləyici ilə yarpaqdan çilənməsi
- İşçi məhlul üçün 300 litr suda gübrəni həll edib, axşam saatlarında çiləyicinin iri damcılı forsunkaları ilə tətbiq olunması daha məqsədə uyğundur

YONCANIN İKİNCİ VƏ SONRAKI İLLƏRİNDƏ

Doza: APALQUA NP 11-37 - 15 kq/ha

Tətbiq Zamanı: Regiondan asılı olaraq təqribən Fevralın ikinci yarısı, Martın əvvəli

Tətbiq Üsulu:

- Çiləyici ilə yarpaqdan çilənməsi
- İşçi məhlul üçün 300 litr suda gübrəni həll edib, axşam saatlarında çiləyicinin iri damcılı forsunkaları ilə tətbiq olunması daha məqsədə uyğundur

ƏKİN QABAĞI TƏTBİQİ

Doza: APALQUA NP 11-37 -200 kq/ha

Tətbiq Zamanı: Əkindən öncə

Tətbiq Üsulu:

- Gübrə əkin qabağı torpağa çilənərək tətbiq olunur.
- Torpağa bərabər şəkildə yayılmasına diqqət yetirilməli

Qeyd:

- Tətbiqdən sonra torpağın 5-10 sm dərinliyinə diskli mala ilə qarışdırılması məsləhətdir.

YARPAQDAN TƏTBİQ (ƏKİN SONRASİ)

Doza: APALQUA NP 11-37 - 15 kq/ha

Həll Edilməsi: 300 litr suda

Tətbiq Üsulu:

- Çiləyici ilə çilənməsi
- İşçi məhlul üçün 300 litr suda gübrəni həll edib, axşam saatlarında çiləyicinin iri damcılı forsunkaları ilə tətbiq olunması daha məqsədə uyğundur

Tətbiq Zamanı:

- 8 yarpaq mərhələsindən ucvurma mərhələsinə qədər, çiçəkləmədən iki üç həftə öncə