RIMAPRIMER (Imprimante epóxico)

Principalmente formulado con resinas epóxicas poliamidas, de excelente resistencia a la abrasión, corrosión y ataques químicos. Es el primer perfecto para superficies de concreto dado el alto poder de adherencia en superficie.

USO

Utilizado como primer para estructuras de concreto.

APLICACIÓN

1. Preparación de Superficie

La superficie deberá estar libre de polvo, aceite, humedad y todo tipo de contaminantes.

2. Condiciones Ambientales

- Temperatura de Aire: 10-35°C
- Temperatura de Superficie: 5 – 30 °C (al menos 3°C por encima de punto de rocío)
- Humedad relativa: hasta 80%

3. Equipo de Aplicación

- Rodillo

4. Precauciones de Seguridad

1. Utilice correctamente la ratio de mezcla y homogenice con mezclador de 3 a 5 minutos antes de utilizar. (Use mezclador eléctrico de al menos 1000RPM.500W)
2. Evitar contacto con ojos y piel.
3. Mantenga ventilación adecuada durante la aplicación.
4. Vida útil del material catalizado de 40 min a 25°C
5. No mezclar con otros productos.
6. En caso de utilizar DILURIMA PRO-1000, mézclelo regularmente.

	10°C	20°C	30°C
Secado (horas)	18	6	4
Vida mezcla (horas)	24	20	12
Repintado (horas)	18-72	6-72	4-72

Acabado	**Brillante**
Color	Transparente
Aplicar sobre	Mortero, concreto
Componentes	2
Mix-ratio(vol.)	A part: B part = 1: 1
Sólidos por Vol. (%)	28+-3%
Espesor de Película	50㎛
Manos	1-2
Rendimiento	5.6 m²/L (@D.F. T 50㎛) Considere desperdicios en aplicación e irregularidad en superficies.
Thinner	DILURIMA PRO-1000
Vida	12 meses
Almacenamiento	(Almacenado en interiores a 5-35°C)

Observaciones

Ver condiciones generales
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.