

WURZEL PLUS. Es un producto fitorregenerador radical que promueve el enraizamiento de los cultivos estimula la emisión de nuevas raíces y pelos absorbentes, así como el crecimiento de las mismas, ayuda a superar rápidamente los periodos de estrés por trasplante, además contiene un formulado esteroideal que lo hace mas eficiente.

BENEFICIOS AL APLICAR WURZEL PLUS

- Mayor numero de raíces y pelos absorbentes
- Rápido anclaje después de su aplicación
- Favorece la brotación de yemas laterales

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSES Litro Via Foliar	MOMENTO DE APLICACIÓN
Agave	0.5 - 1	Aplicar durante todo el ciclo con intervalo de 25 o 30 dias
Aguacate	0.5 - 1	Desde el trasplante, desarrollo, prefloración, floración y fructificación con intervalos de 15 a 21 dias.
Alfalfa	0.5	Al follaje una aplicación a la semana del corte.
Banano	0.5 - 1	Durante el desarrollo, realizar aplicaciones cada 15 a 21 dias.
Berries Arándano, Frambuesa, Fresa, Zarzamora	0.5 - 1	Al trasplante, prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 dias.
Cebolla, Ajo	0.5	Al trasplante y realizar aplicaciones con intervalo de 15 dias.
Citricos	0.5 - 1	Durante el desarrollo vegetativo, a la caída del pétalo y en plena fructificación. Realizar aplicaciones cada 30 dias
Calabaza, pepino	0.5 - 1	Al trasplante, inicio de floración hasta crecimiento de frutos.
Jitomate, Pimiento, Chile	0.5 - 1	Al trasplante, prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 dias.
Leguminosas	0.5 - 1	Realizar 2 aplicaciones, durante el desarrollo y en prefloración.
Lechuga, Repollo, Brócoli, Coliflor	0.5 - 1	Durante el desarrollo vegetativo, hasta el inicio de la inflorescencia. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 dias.
Mango	0.5 - 1	Desde el trasplante, desarrollo, prefloración, floración y fructificación con intervalos de 15 a 21 dias.
Maiz, Sorgo	0.5 - 1	Realizar 3 aplicaciones durante todo el ciclo iniciar cuando las plantas tengan de 6 a 9 hojas, durante la aparición de estigmas y llenado.
Manzana, Pera, Durazno, Ciruelo	0.5 - 1	Desde el trasplante, desarrollo, prefloración, floración y fructificación con intervalos de 15 a 21 dias.
Melón, Sandía	0.5 - 1	Desde el trasplante y realizar aplicaciones cada 15 dias.
Papa	0.5 - 1	Iniciar en la segunda semana después de la emergencia, repetir cada 20 dias hasta la formación del tubérculo.
Papaya	0.5 - 1	Al trasplante, prefloración, floración, hasta crecimiento de frutos.
Uva de mesa	0.5 - 1	Al trasplante, prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 dias.



INDICACIONES DE USO

Es compatible con la mayoría agroquímicos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Agítase el producto antes de vertirlo al agua o solución.