

CEI ESCOLETA KINDER MARRATXÍ

07016773

Quan no hauria d'assistir un alumne al centre?

(Basat en les Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi publicades per la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut i Consum, 2019)

Un alumne o alumna NO HAURIA D'ASSISTIR al centre escolar o la família hauria d'anar-lo a recollir si presenta algun d'aquests signes:

- Febre (temperatura axil·lar $\geq 37,5$ °C)
- Dificultat respiratòria
- Diarrea
- Vòmits
- Erupcions a la pell amb febre fins que el metge determini si la causa és infecciosa o no
- Lesions bucals o nafres disseminades a la boca associades a incapacitat de controlar la salivació, afectació de l'estat general o dificultat per ingerir correctament
- Conjuntivitis purulenta amb pus o exsudat seropurulent, ull vermell o parpella enrogida

Un alumne o alumna NO HAURIA D'ASSISTIR al centre educatiu si pateix alguna de les següents afeccions:

Malaltia

Període de no assistència recomanat

Bronquiolitis per VRS

Fins que deixi de tenir febre i dificultat respiratòria

Agarre

Fins que deixi de tenir febre i hagi millorat l'estat general

Tos ferina

5 dies després d'iniciar el tractament / 21 dies si no s'ha tractat

Tuberculosi

Fins que el metge o l'autoritat sanitària ho autoritzi

COVID-19

Fins que el metge o l'autoritat sanitària ho autoritzi

Malalties gastrointestinals

Malaltia

Període de no assistència recomanat

Gastroenteritis

24 h després de la darrera diarrea o vòmit.
En casos especials (salmonel·la Paratyphi, E. coli hemorràgic, shigel·losi...) fins que el pediatre ho indiqui.

Malalties de la pell o de les mucoses

Malaltia

Període de no assistència recomanat

Conjuntivitis purulenta

Fins que no hi hagi secreció purulenta

Escarlatina

24 h després d'iniciar antibiòtic

Impètig

Fins que es curin les lesions o 48 h després d'iniciar antibiòtic. Cal tapar lesions exposades.

Rubèola, xarampió, galteres

5 dies després de l'inici de les taques;
galteres: 5 dies després de la inflamació

Sarna

Després d'iniciar el tractament. Cal tapar lesions exposades.

Varicel·la

5 dies després de l'inici de les lesions i lesions amb crosta han d'estar cobertes.

Altres malalties

Malaltia

Període de no assistència recomanat

Hepatitis A

Fins a 7 dies després de l'inici dels símptomes

Meningitis bacteriana

Fins a recuperació completa

Meningitis vírica

Fins a recuperació completa

En cas de dubte, el millor és consultar el pediatre dels nins i nines.

