

¿Cuándo no debería asistir un alumno al centro? (basado en las Recomendaciones de no asistencia a centros educativos por procesos infecciosos y riesgo de contagio publicadas por la Consejería de Educación y la Consejería de Salud y Consumo (2019))

Un alumno o alumna NO DEBERÍA ASISTIR al centro escolar o la familia debería acudir a buscarlo si presenta alguno de estos signos:

- fiebre (temperatura axilar $\geq 37,5$ °C)
- dificultad respiratoria
- diarrea
- vómitos
- erupciones en la piel, con fiebre, hasta que el médico determine si la causa es infecciosa o no lo es
- lesiones bucales o llagas diseminadas en la boca, asociadas a la incapacidad del niño de controlar la salivación, que afectan a su estado general (excepto si el médico determina que la enfermedad no es infecciosa) y/o no le permiten ingerir de forma adecuada
- conjuntivitis purulenta: pus o exudado seropurulento en los ojos, acompañado con ojo rojo o enrojecimiento del párpado o de la piel que los rodea.

Un alumno o alumna NO DEBERÍA ASISTIR al centro educativo si sufre alguna de estas afecciones:

Enfermedad	Periodo de no asistencia recomendado
Enfermedades respiratorias	
Bronquiolitis por VRS	Hasta que deje de tener fiebre y dificultad respiratoria
Agarre	Hasta que deje de tener fiebre y haya mejorado su estado general
Tos ferina	5 días después del inicio del tratamiento
	21 días después si no se ha tratado
Tuberculosis	Hasta que el médico o la autoridad sanitaria lo autorice
COVID-19	Hasta que el médico o la autoridad sanitaria lo autorice

Enfermedades gastrointestinales	
Gastroenteritis	24 horas después de la última diarrea o del último vómito En algunos casos (gastroenteritis por salmonella Paratyphi, E. coli de tipo hemorrágico, shigelosis...) no debe acudir al centro educativo hasta que el pediatra lo indique.
Enfermedades de la piel o de las mucosas	
Conjuntivitis purulenta	Hasta que no presente secreción purulenta
Escarlatina	24 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico
Impétigo	Hasta que se curen las lesiones o 48 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Es necesario tapar las lesiones que estén en zonas expuestas
Rubéola, sarampión, galteras	5 días después del inicio de las manchas. En el caso de las galteras, 5 días después de la inflamación de las glándulas
Sarna	Después de iniciar el tratamiento. Es necesario tapar las lesiones que estén en zonas expuestas
Varicela	5 días después del inicio de las lesiones. Todas las lesiones que presenten costras deben cubrirse.
Otras enfermedades	
Hepatitis A	Hasta 7 días después de que se hayan iniciado los síntomas
Meningitis bacteriana	Hasta que no se haya recuperado del todo
Meningitis vírica	Hasta que no se haya recuperado del todo

En caso de duda, lo mejor es consultar al pediatra de los niños y niñas.